

适用于绝经后有骨折高风险的骨质疏松症女性患者

EVENITY[®]
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

使用 EVENITY[®]
并非只是减缓骨质流失，
还可以构建新骨



现在是时候重新思考对骨质疏松症治疗的期望了。

适应症

EVENITY[®] 是一种处方药，用于治疗骨折高风险或不能使用另一种骨质疏松药物或其他骨质疏松药物效果不佳的绝经后女性患有的骨质疏松。

重要安全性信息

EVENITY[®] 可导致严重副作用，包括心脏病发作、卒中或心血管（心脏或血管）问题导致死亡的风险增加。如果您出现以下任何症状，请立即联系您的医务人员或寻求紧急帮助：**心脏病发作症状**，（可能包括：胸痛或胸闷；呼吸急促；感觉头晕目眩或头晕；或**卒中症状**，（可能包括：头痛；面部、手臂或腿部麻木或无力；说话困难；视力变化或失去平衡）。在您接受 EVENITY[®] 之前，如果您有过心脏病发作或中风，请告诉您的医务人员，特别是如果您在过去一年中发生过心脏病发作或中风更是如此。

其他重要安全性信息请参见第 8 页。

骨质疏松症 简要信息

EVENITY[®]
(romosozumab-aqgg)
injection 105 mg/1.17 mL



50 岁以上 1/2
的女性会因为骨
质疏松发生骨折

- 在发生一次与骨质疏松相关的骨折后，您在**一年内发生另一次骨折的可能性增加 5 倍**
- **骨骼是一种生命器官**，它可以像皮肤和头发一样不断更新
- 在绝经后，您的身体流失的**骨骼**比产生的要多
- **骨质疏松症是一种无症状的进行性疾病**，其唯一的预警体征可能是骨折



重要安全性信息

如果您患有低血钙症；或者对 romosozumab 或 EVENITY[®] 中任何成分过敏，请勿使用 EVENITY[®]。

其他重要安全性信息请参见第 8 页。

想要骨骼更强壮？
请立即与您的医生讨论使用
EVENITY[®] 构建骨骼。



经证明，在短短 12 个月内，**EVENITY®** 可将新发脊柱骨折的风险降低

73%

该研究随访了 7180 名绝经后骨质疏松妇女接受 **EVENITY®** 或安慰剂（一种无药物治疗）12 个月。

第 12 个月时，接受 **EVENITY®** 的女性新发脊柱骨折（0.5%）少于接受安慰剂的女性（1.8%）。第 12 个月时，除脊柱外的骨折减少并不显著。

EVENITY® 与安慰剂相比在 12 个月时增加了骨密度。



BMD 结果并不意味着骨折风险降低。

在相同的临床研究中，与接受安慰剂的女性相比，接受 **EVENITY®** 治疗的女性的下脊柱、髌骨和股骨颈骨密度（BMD）显著增加。

这就是为什么现在可能是向您的医生咨询 **EVENITY®** 的好时机。

重要安全性信息

EVENITY® 可能导致严重副作用。可能的严重副作用包括严重过敏反应、低血钙、重度颌骨问题和异常的大腿骨骨折。

其他重要安全性信息请参见第 8 页。

是时候使用 **EVENITY®** 开始构建新骨了吗？
请向您的医生咨询您的骨密度评分。



为什么选择

EVENITY®

EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

骨质疏松症是进行性的。使用 **EVENITY®** 不非只是减缓骨质流失，还可以构建新骨。

EVENITY® 是第一种也是唯一一种治疗骨质疏松症的药物，有两种作用方式。

骨与骨质疏松症



未治疗

第 12 个月时从接受安慰剂的绝经后骨质疏松女性中采集骨盆骨样本。

使用 **EVENITY®** 治疗

在第 12 个月时从接受 **EVENITY®** 治疗的绝经后骨质疏松女性中采集骨盆骨样本。

仅用于说明目的。在一项包含 139 名绝经后骨质疏松女性的子研究中，从 2 名不同的女性中采集骨样本。选择的图像来自接近每组平均值的女性。

仅 **EVENITY®** 有两种作用方式：它与您的身体自然能力结合，**构建新骨**，在较小程度上，**减缓骨丢失**。



其他常用的骨质疏松治疗处方有两种作用方式：抗再吸收药物减缓骨丢失，而合成代谢剂有助于刺激骨形成。

重要安全性信息

EVENITY® 最常见的副作用是关节痛和头痛。

其他重要安全性信息请参见第 8 页。

准备好做的不仅仅是减缓骨质流失了吗？

如果现在可以开始构建新骨，请咨询您的医生。



与一些需要每天或每周使用的骨质疏松症治疗药物不同，**EVENTITY® 每月给药一次，持续 12 个月。**



每个 EVENTITY® 的剂量包含 2 次注射



EVENTITY® 需要每个月在您的诊室访视期间进行注射

每个 EVENTITY® 剂量由您的医务人员每月在您的皮肤下注射 2 次组成。当您接受 EVENTITY® 时，您应按照医嘱服用钙和维生素 D。

如果您错过预约，请尽快联系您的医生重新安排。



EVENTITY® 仅使用 12 个月

**开始对话。今天请向您的医生咨询
EVENTITY®。**

当与您的医生讨论骨质疏松症及其治疗时，重要的是询问如何建立新骨而不仅仅是减缓骨丢失。

以下几个关键问题可以帮助您开始今天的谈话：

- 1** 我很担心自己的骨密度扫描结果。EVENTITY® 是否真的有助于构建新骨并增加骨量？
- 2** 我知道我有骨折的高风险。使用 EVENTITY® 进行骨构建是否有助于降低骨折风险？
- 3** 我真的可以在 12 个月内预期到结果吗？

EVENTITY® 治疗 12 个月后， 请向您的医生咨询

- 安排一次骨密度扫描，以查看您在 EVENTITY® 治疗后的治疗结果
- 后续抗吸收治疗，以维持新骨形成

重要安全性信息

当您接受 EVENTITY® 时，您应按照医嘱服用钙和维生素 D。

其他重要安全性信息请参见第 8 页。

[请点击此处下载讨论指南。](#)


任何时候，只要您开始使用新药，就应该了解可能的副作用。在骨质疏松症的情况下，了解不对其进行治疗可能会导致较高的骨折风险也很重要。与您的医生进行沟通，您可以一起做出明智的决定。



**一项在超过 7,000 名女性中进行的
EVENITY® 研究**

药物安全性很重要。对 EVENITY® 进行了研究，以了解服用该药带来的益处和可能的副作用。

一项 EVENITY® 研究评价了超过 7000 名接受 EVENITY® 或安慰剂的绝经后骨质疏松妇女。最常见的副作用是关节痛和头痛。这些不是 EVENITY® 的所有可能副作用。请咨询您的医生，了解更多关于 EVENITY® 潜在严重副作用的信息。见以下报告的研究中最常见的副作用比较。



其他重要安全性信息请参见第 8 页。

了解更多信息，请访问 evenity.com。



许多医疗保险和商业计划承保了
EVENITY®。

个体患者的自付费用会有所不同。

MEDICARE

大多数 Medicare B 部分患者有额外保险，
每剂 **EVENITY®** 支付 **0 美元**。^{*†}

- ▶ 在您符合免赔额后，Medicare B 部分通常承保您在医生办公室接受的 80% 治疗
- ▶ 您可以获得额外的保险（例如，Medicare 补充计划或 Medigap、商业保、TRICARE），以获得额外的 20%[‡]
 - ▶ 自付费用不包括门诊访视或接受 **EVENITY®** 相关的费用。额外的保险可能需要每月额外的保险费
 - ▶ 您为 **EVENITY®** 支付的费用取决于您的 Medicare 计划类型

商业保险

符合资格的商业保险患者可以通过
Amgen® 的共付额计划每剂只需支付
25 美元。

- ▶ 资格标准和计划上限适用。适用条款和条件。了解完整的条款和条件以及资格要求，请致电 1-800-761-1558 或访问 EVENITYSupport.com

^{*}该信息基于 Amgen® 2020 年 10 月至 2021 年 3 月的保险核查数据。该分析仅纳入了 **EVENITY®** 前瞻性患者。

[†]您支付的金额可能取决于 Medicare 补充保险 (Medigap) 的承保范围。

[‡]您必须参加 Medicare A 部分和 B 部分，才能通过 Medicare 补充保险 (Medigap) 获得保险。Medicare 补充保险可能需要支付每月额外保险费。

未受保人

- ▶ 如果您未投保或投保不足，请拨打 1-866-AMG-ASST (1-866-264-2778) 了解 Amgen® 安全网基金会



请参见第 8 页的重要安
全性信息。

如果您不确定您有什么
Medicare 计划或正在寻找更多信
息，与您的保险公司讨论并进行访
视 eventy.com/paying 查
看更多详细信息。



重要安全性信息

关于 EVENITY®，我应该了解的最重要信息是什么？

EVENITY® 可导致严重副作用，包括心脏病发作、卒中或心血管（心脏或血管）问题导致死亡的风险增加。如果您出现以下任何症状，请立即联系您的医务人员或寻求紧急帮助：**心脏病发作症状**，（可能包括：胸痛或胸闷；呼吸急促；感觉头晕目眩或头晕；或**卒中症状**，（可能包括：头痛；面部、手臂或腿部麻木或无力；说话困难；视力变化或失去平衡）。在您接受 EVENITY® 之前，如果您有过心脏病发作或中风，请告诉您的医务人员，特别是如果您在过去一年中发生过心脏病发作或中风更是如此。

如果您存在低血钙；或对 romosozumab 或 EVENITY® 中的任何成分过敏，请勿接受 EVENITY®。

在接受 EVENITY® 前，告知您的医务人员您的所有身体状况，包括您是否：

- 有其他心脏或血管疾病史
- 血钙低
- 不能每天服用钙和维生素 D
- 有肾脏问题或正在进行肾脏透析
- 计划进行牙科手术或拔牙

EVENITY® 可能的副作用是什么？

EVENITY® 可能导致严重副作用，包括：

接受 EVENITY® 的患者曾发生严重过敏反应。如果您出现严重过敏反应的任何症状，包括皮疹；荨麻疹；面部、唇部、口腔、舌部或咽喉肿胀，可能导致吞咽或呼吸困难，请立即联系您的医务人员或到最近的急诊室就诊。


EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

重要安全性信息 (续)

血钙水平降低（低钙血症）。EVENITY® 可降低血钙水平。在您接受 EVENITY® 之前，应治疗您的低血钙。如果您出现低血钙症状，例如：肌肉痉挛、抽搐或痉挛；手指、脚趾或嘴周麻木或刺痛，请联系您的医务人员。

可能发生重度颌骨问题（骨坏死）。您的医务人员应在您开始 EVENITY® 之前检查您的口腔，并可能告诉您看牙医。关于良好的口腔护理，请咨询您的医务人员或牙医。

异常大腿骨折。此类骨折的症状包括髋关节、腹股沟或大腿新发或异常的疼痛。

EVENITY® 最常见的副作用包括关节痛和头痛。这些不是 EVENITY® 所有可能的副作用。致电您的医生，寻求有关副作用的医疗建议。

建议您向 FDA 报告处方药的不良副作用。
访问 www.fda.gov/medwatch，
或致电 1-800-FDA-1088。

请参见 EVENITY® 完整处方信息和用药指南。

不要让一次骨折束缚您的行动能力。



今天请告知您的医生。



EVENITY[®]

(romosozumab-aqqg)

injection 105 mg/1.17 mL

今天就和你的医生谈谈 **EVENITY[®]**，
访问 **EVENITY.com** 了解更多信息。



**BONE
MATTERS[®]**

获得 **Bone Matters[®]** 项目的支持。
请在 **evenity.com/BM** 注册

请参见第 8 页的重要安全性信息。